



使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。


下痢でおなかがいたいとき、食あたりに ビオフェルミン® 下痢止め

シャクヤクエキス・ビフィズス菌配合

第2類医薬品

特徴

- 下痢でおなかがいたいときによく効く
「ロートエキス」と「シャクヤクエキス」が下痢でおなかがいたいときに効果的にはたらきます。
- 下痢でいたんだおなかを保護する
「タンニン酸ベルベリン」、「ゲンノショウコ乾燥エキス」がいたんだ腸粘膜を保護し、下痢を改善します。
- おなかにやさしく効く
「ビフィズス菌」が便性(下痢便状態)を改善し、おなかにやさしくはたらきます。
- のみやすく、携帯に便利
苦み、においが少ない、のみやすい淡黄かっ色～黄かっ色の錠剤で、携帯に便利なPTP包装です。



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人または粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢または腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
 - (4) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障
 - (9) 副交感神経遮断剤(ベラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド、ロートエキス等)を含有する内服薬を服用している人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
口のかわき、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効 能

腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便



用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15 歳 以 上	3 錠	3 回
11 歳 ~ 14 歳	2 錠	
11 歳 未 満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。
- (3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成 分

9錠(15歳以上の1日服用量)中

成 分	含 量	はたらき
タンニン酸ベルベリン	300mg	腸内の異常な腐敗・醗酵を抑えます。また、いたんだ腸粘膜を保護します。
ゲンノショウコ乾燥エキス <small>(ゲンノショウコ約4,200mgより抽出)</small>	420mg	民間薬として用いられ、いたんだ腸粘膜を保護します。
ロートエキス	33mg	異常にたかまった腸の運動を抑え、腹痛を和らげます。
シャクヤクエキス <small>(シャクヤク約500mgより抽出)</small>	125mg	古来から鎮痛鎮痙薬として用いられ、腹痛を和らげます。
ビフィズス菌	30mg	下痢のときに乱れた腸内菌叢のバランスを整え便性を改善します。


添加物：トウモロコシデンプン、アメ粉、カルメロースカルシウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム

<成分に関連する注意>

生薬(薬用の草根木皮など)を用いた製品ですから、製品により錠剤の色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 箱の「開封年月日」記入欄に、内袋(アルミ袋)を開封した日付を記入してください。
- (6) 一度内袋(アルミ袋)を開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。



包 装

[PTP包装] 30錠

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
 Biofermin 製薬株式会社 お客様相談窓口
 〒650-0021 神戸市中央区三宮町一丁目1番2号 電話 (078) 332-7210
 受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

Biofermin 製薬株式会社

販売元

大正製薬株式会社

神戸市西区井吹台東町七丁目3番4

東京都豊島区高田3丁目24番1号